

## *Инструкция по применению*

### **Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)**

#### **«Эпифил спрей»**

**ТУ 9392 – 050 – 49908538 - 2010**

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.37.002.Е.014975.10.12 от 24.10.2012

*Инструкция по применению разработана*

*ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва;*

*ООО “НКФ ОМЕГА-ДЕНТ”, Россия.*

Средство «Эпифил спрей» предназначено для профессионального применения в учреждениях стоматологического профиля, а также в прочих организациях, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

#### **1. Общие сведения**

1.1. Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «Эпифил спрей» (далее по тексту – средство) представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной жидкости светло-голубого оттенка с ароматизатором. рН средства  $7,0 \pm 1,0$  ед.

В качестве действующих веществ содержит: изопропиловый спирт; хлоргексидина биглюконат, а также увлажняющие, смягчающие и тонирующие кожу добавки, ароматизатор, прочие технологические и функциональные компоненты.

Срок годности средства – 3 года со дня производства в невскрытой упаковке изготовителя при соблюдении условий хранения.

1.2. Средство «Эпифил спрей» обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, туберкулоцидной активностью (тестировано на культуре тест-штамма *Mycobacterium B5*), фунгицидной активностью (включая патогенные грибы *Candida* и рода *Trichophyton*).

Средство обладает пролонгированным антибактериальным действием в течение 1 часа на незащищенной коже рук.

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство «Эпифил спрей» относится к 4 классу малоопасных соединений; при нанесении на кожу и попадании в желудок не оказывает местнораздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия в рекомендованных режимах применения. Нанесение на скарифицированную кожу не осложняет заживление искусственно нанесенных ран. Средство вызывает слабое раздражение слизистых оболочек глаз при внесении в конъюнктивальный мешок. Ингаляционная опасность в режимах применения маловероятна.

1.4. Средство «Эпифил спрей» предназначено в качестве кожного антисептика для:

- гигиенической обработки рук медицинского и обслуживающего персонала в учреждениях стоматологического профиля, лечебно-профилактических и медицинских организациях.

#### **2. Применение средства**

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «Эпифил спрей» представляет собой готовое к применению средство.

Обработка кожных покровов рук медицинским и обслуживающим персоналом в учреждениях стоматологического профиля должна проводиться с учетом требований СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (от 18.05.2010 № 58).

2.1. *Гигиеническая обработка рук:* проводится однократная обработка. Средство в количестве 2-3 мл наносят на кисти рук орошением (10-15 нажатий на головку распылителя) и втирают в кожу до полного высыхания (не менее 20-30 сек.), с особой тщательностью обрабатывая околоногтевые и межпальцевые участки.

### **3. Меры предосторожности**

- 3.1. Использовать только для наружного применения в соответствии со способом применения. **Не принимать внутрь!**
- 3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.
- 3.3. Избегать попадания средства в глаза.
- 3.4. Средство пожароопасное, легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. При обработке не курить. Не допускается контакт с окислителями.
- 3.5. По истечении срока годности использование средства запрещается.
- 3.6. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.
- 3.7. Средство «Эпифил спрей» должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки производителя. Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание средства с другими средствами не допускается.
- 3.8. При случайной утечке большого количества средства засыпать его негорючим адсорбирующим материалом (песком, силикагелем и пр.), после чего собрать в емкость для последующей утилизации. Остатки средства смыть с поверхностей большим количеством воды.
- 3.9. *Меры охраны окружающей среды:* не допускать попадания средства в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

### **4. Меры первой помощи**

- 4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой, при появлении гиперемии закапать 20-30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.
- 4.2. При случайном попадании средства внутрь, обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

### **5. Упаковка, транспортирование и хранение**

- 5.1. Средство «Эпифил спрей» выпускается в полиэтиленовых флаконах, закрытых крышечкой с распылительной головкой и колпачком, вместимостью 200±10 мл, по технической документации предприятия-изготовителя.
- 5.2. Транспортировка дезинфицирующего средства – кожного антисептика «Эпифил спрей» осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки спир-тосодержащих (легковоспламеняющихся) грузов, действующими на этих видах транспорта (по ГОСТ 19433-88).
- 5.3. Средство дезинфицирующее – кожный антисептик «Эпифил спрей» хранят в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей вдали от источников тепла и солнечного света, при температуре от -5°C до +30°C в крытых складских помещениях, отдельно от лекарственных средств, пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

### **6. Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

### **7. Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

### **Сведения о производителе**

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru