




Готовый к применению кожный антисептик для предоперационной обработки кожи перед взятием проб крови и инъекциями.

Кодан Тинктюр Форте

Наши преимущества:

- широкий спектр антисептического действия
- быстрое действие (15 секунд перед инъекцией)
- отличная кожная переносимость
- хорошее заживление послеоперационных хирургических швов после высыхания

Область применения

- Антисептическая обработка кожи перед операциями, инъекциями и взятием проб крови, пункциями, а также перед экскизией, катетеризацией и биопсией
- Обработка ран и послеоперационных швов
- Гигиеническая дезинфекция рук (только Кодан Тинктюр Форте Бесцветный)
- Проведение основных санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению грибковых кожных инфекций.

Методы применения / Показания к применению

Антисептическая обработка кожи перед инъекциями, пункциями, экскизией и т.д.:

Распылите Кодан Тинктюр Форте на область пораженной кожи или протрите ее смоченным в растворе тампоном, после чего оставьте на определенное время. При применении Кодан Тинктюр Форте перед глюкозотолерантными тестами (например, с помощью тестполосок для определения глюкозы), следует дождаться полного высыхания препарата, чтобы результаты тестов были точными.

Перед взятием пункций суставов и предоперационной обработкой кожи:

В случае необходимости, удалите волосяной покров на пораженном участке.

Если возможно, искупайте или помойте пациента или пораженный участок кожи (например, с применением Эзэмтана или лосьона для мытья тела Октенисан) хотя бы за один час до обработки кожи.

Обработка ран и послеоперационных швов

Для обработки ран и послеоперационных швов, Кодан Тинктюр Форте наносится либо с помощью стерильного тампона, либо распыляется напрямую из соответствующего флакона. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы был обеспечен хороший дренаж. Послеоперационные хирургические швы желательно протирать смоченным в растворе тампоном.

Гигиеническая дезинфекция рук

При гигиенической обработке, руки должны быть увлажнены на протяжении всего времени контакта.

Микробиологическая эффективность

- бактерицидная, (включая микобактерии (tbB))
- фунгицидная
- вирусы с оболочкой (включая гепатит B, ВИЧ, гепатит C, вирус простого герпеса)
- ротавирус и аденоовирус

Область применения / патогенные микроорганизмы	Рекомендации по применению / Время контакта
Кожа с несколькими сальными железами (согласно сертификату VAH-/DGHM): • перед инъекциями и взятием проб крови: • перед взятием пункций суставов: • перед до- и после-операционной дезинфекцией кожи:	15 сек 60 сек 60 сек
Обрабатывайте пораженный участок каждый раз перед процедурами, проводимыми на коже с сальными железами	2 мин
Гигиеническая дезинфекция кожи (согласно сертификату VAH-/DGHM):	3 мл Кодан Тинктюр Форте Бесцветный в неразведенном виде - 30 сек
MP3C	30 сек
Вирусы: • вирусы с оболочкой (включая гепатит B, ВИЧ, гепатит C, вирус простого герпеса): • ротавирус • аденоовирус	15 сек 30 сек 10 мин

Кодан Тинктюр Форте

Данные о препарате

Состав: в 100 г раствора содержатся:

Активные ингредиенты: 45.0 г 2-пропанол, 10.0 г 1-пропанол, 0.20 г 2-бифенол

Вспомогательные вещества: 30% раствор перекиси водорода (Европейская фармакопея), очищенная вода

Кодан Тинктюр Форте Цветной также содержит красители Е 104, Е 110, Е 151.

Химико-физические свойства:

Цветной

Внешний вид: раствор коричневого цвета
Плотность: 0.896 ± 0.003 г/см³

Бесцветный

Внешний вид: бесцветный раствор
Плотность: 0.896 ± 0.003 г/см³

Температурная стабильность стабилен между - 5°C и + 40°C

Точка возгорания: 24°C (согласно DIN 51 755)

Особые рекомендации

Кодан Тинктюр Форте применяется в неразбавленном виде. Область пораженной кожи должна быть тщательно обработана. Только для наружного применения. Хранить вне досягаемости детей. Легковоспламеним. Не распылять вблизи открытого огня или источников электрической энергии.

Поставка / Упаковка

Данная продукция доступна не в каждой стране. Для получения необходимой информации, пожалуйста, свяжитесь с местным дочерним предприятием или дистрибутором

Размер емкости	Количество в упаковке	Артикул
Кодан Тинктюр Форте Бесцветный 6 мл флакон с насадкой для тампонов	40 x 6 мл	104021
250 мл флакон с распылителем	10 x 250 мл	104005
1 л флакон	10 x 1 л	104007
2 л флакон	5 x 2 л	104006
Упаковка для больниц 250 мл флакон с распылителем	10 x 250 мл	104021
1 л флакон	10 x 1 л	104007
2 л флакон	5 x 2 л	104010
Кодан Тинктюр Форте Цветной 250 мл флакон с распылителем	10 x 250 мл	104802
1 л флакон	10 x 1 л	104804
2 л флакон	5 x 2 л	104803

Дополнительные принадлежности / Дозировка

	Артикул
Распылитель на 1 л флакон (1 шаг дозировки = 1.2 мл +/- 0.1 мл)	108112
Насадка для тампонов на 1 л флакон	129003

Подробную информацию Вы можете найти в брошюре компании s&t "Дополнительные принадлежности и Дозировка".

Влияние на окружающую среду

Шульке производит экономичную продукцию с помощью современных и безопасных для окружающей среды технологий производства, но при этом придерживаясь стандартов высокого качества.

Отчеты экспертов и дополнительная информация

Для обозрения полного спектра нашей продукции, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу www.schuelke.com

Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами:

Обслуживание клиентов

Телефон: +49 (0)40 521 00-666

e-mail: info@schuelke.com

Кодан Тинктюр Форте Бесцветный

Состав: 100 г раствора содержат: 2-пропанол (Европейская Фармакопея) 45.0 г, 1-пропанол (Европейская Фармакопея) 10.0 г, 2-бифенол 0.20 г. Вспомогательные вещества: 30% раствор перекиси водорода (Европейская Фармакопея), очищенная вода.

Показания к применению: Для дезинфекции кожи перед хирургическими процедурами, антисептической обработки ран и послеоперационных швов. Для гигиенической дезинфекции рук, а также для проведения основных санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению грибковых кожных инфекций.

Противопоказания: Не использовать Кодан Тинктюр Форте Бесцветный при гиперчувствительности к одному из компонентов препарата. Кодан Тинктюр Форте не следует использовать для хирургической обработки рук.

Меры предосторожности: Только для наружного использования. Не распылять вблизи открытого огня и источников электрической энергии. Накладывать повязку только после полного высыхания Кодан Тинктюр Форте Бесцветный. Не проводить термоагуляцию на пораженной коже до тех пор, пока Кодан Тинктюр Форте Бесцветный полностью не высохнет.

Побочные эффекты: При частом использовании, могут наблюдаться такие виды раздражений, как покраснение, жжение и сухость кожи. В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции (например, контактная экзема).

Производитель: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Нордерштедт, Германия

В случае возникновения серьезных побочных эффектов или побочных эффектов, не отмеченных нами в данной брошюре, пожалуйста, сообщите об этом своему доктору или фармацевту.

Кодан Тинктюр Форте Цветной

Состав: 100 г раствора содержат: 2-пропанол (Европейская Фармакопея) 45.0 г, 1-пропанол (Европейская Фармакопея) 10.0 г, 2-бифенол 0.20 г. Вспомогательные вещества: 30% раствор перекиси водорода (Европейская Фармакопея), хинолиновый жёлтый, апельсиновый жёлтый S, бриллиантовый черный РН, очищенная вода.

Показания к применению: Для дезинфекции кожи перед хирургическими процедурами, антисептической обработки ран и послеоперационных швов. Для гигиенической дезинфекции рук, а также для проведения основных санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению грибковых кожных инфекций.

Противопоказания: Не использовать Кодан Тинктюр Форте Цветной при гиперчувствительности к одному из компонентов препарата.

Меры предосторожности: Только для наружного использования. Не распылять вблизи открытого огня и источников электрической энергии. Накладывать повязку только после полного высыхания Кодан Тинктюр Форте Цветной. Не проводить термоагуляцию на пораженной коже до тех пор, пока Кодан Тинктюр Форте Цветной полностью не высохнет.

Побочные эффекты: При частом использовании, могут наблюдаться такие виды раздражений, как покраснение, жжение и сухость кожи. В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции (например, контактная экзема).

